

病 虫 情 报

第 5 期

汨罗市植保植检站

2026 年 7 月 9 日

当前水稻病虫害发生情况及防治意见

一、病虫害发生实况：二化螟：一代二化螟亩残存基数 230 条，最高 860 条；测报灯下 7 月 1 日开始到 7 月 8 日出现了一次蛾峰，田间发育进度调查，二化螟化蛹率 16.3%，预计二代二化螟卵孵盛期 7 月 15-22 日。此代发生期长，靠近上代残存基数较大的早稻田和再生稻周边的一季稻及早插晚稻将偏重发生。稻飞虱：田间若虫量上升快，系统调查田调查百丛虫量从上星期的 34 头上升为当前的 87 头，测报灯下稻飞虱成虫量也明显高于去年同期。稻纵卷叶螟：田间蛾、卵、幼虫、蛹并存，测报灯下 6 月 19 日开始到 6 月 29 日出现了一次蛾峰。纹枯病：再生稻和中稻发病蔸率 3.3%-11%，发病株率 0.8%-7.1%；部分氮肥施用量较高的再生稻田块发病蔸率达 30%以上。稻瘟病：在少数老发病区早稻和再生稻部分易感品种发生，主要表现为穗颈瘟和叶瘟。我市当前稻作类型多，加上近期高温高湿的天气条件极利于水稻病虫害发生和危害，病虫害防控压力大。各农户要引起高度重视，针对

病虫害发生实况和不同稻作类型，切实搞好分类防治，做到双抢和病虫害防治两不误。

二、防治适期及对象：7月12日-20日，再生稻、中稻主治纹枯病、稻瘟病、稻纵卷叶螟，兼治二化螟和稻飞虱等。一季晚稻及晚稻秧田主治二化螟、稻飞虱，兼治稻纵卷叶螟、预防稻瘟病等。

三、防治药剂：二化螟、稻纵卷叶螟选用茚虫威、甲氧虫酰肼、虫螨腈、氯虫苯甲酰胺、氟铃脲任一药剂再与甲维盐、阿维菌素等药剂混用；稻飞虱选用三氟苯嘧啶、噻嗪酮、呋虫胺、吡蚜酮等，虫量大时可与烯啶虫胺、速灭威等药剂搭配混用；纹枯病分蘖末期时优选高含量井·蜡芽或井冈霉素，第二次选用苯甲·丙环唑、噻呋酰胺、己唑醇、嘧菌酯等药剂防治。稻瘟病选用高含量三环唑、嘧菌酯、稻瘟灵、肟菌·戊唑醇、春雷霉素等药剂防治。

四、注意事项：晚稻秧田须喷好送嫁药。秧田及大田初期须抓好稻飞虱防治，预防南方黑条矮缩病发生。稻瘟病老发病区及易感品种须注意病害预防。抢雨停间隙或晴好天气，须避开高温时段选择早晚喷药，确保防效。

公益提示：

- 1.融合推进统防统治和绿色防控，精准用药，提质增效。
- 2.科学安全使用农药，注意农药使用安全间隔期。
- 3.废弃农药包装莫乱扔，污染水土害无穷。